

Unfälle

Richtiges Verhalten bei Zahnunfällen

Richtiges Verhalten ist entscheidend!

Jeder Zahnunfall sollte sofort dem Zahnarzt gemeldet werden! Ob eine Behandlung dringend ist oder nicht, kann nur er entscheiden. Für den Zahnarzt ist es wichtig, schon am Telefon folgendes zu erfahren:

- Was ist geschehen? Wann ? Wie ? Wo ?
- Alter des Kindes ?
- Welche Zähne sind betroffen (Milch- oder bleibende Zähne)?
- Verletzung von Weichteilen (Wangen, Nase, Lippen, Zunge, Zahnfleisch) ?

Je nach Ort und Ausmaß der Verletzung sofort Hausarzt oder Spital bzw. Zahnarzt benachrichtigen und aufsuchen (wenn möglich Impfschein mitbringen).

Bei starker Blutung sauberes Taschentuch fest anpressen (evtl. Druckverband). Den Verletzten möglichst nicht flach lagern.

Bei Zeichen einer Hirnerschütterung (Schwindel, Erbrechen, ungleich große Pupillen) zuerst Hausarzt oder Spital aufsuchen.

Wurde wegen Weichteilverletzungen der Hausarzt oder die Notfallstelle eines Spitals aufgesucht, sollte zur Feststellung allfälliger Zahnschäden auch der Zahnarzt konsultiert werden.


Versicherung

Versicherungsschutz ist auch außerhalb der Schulzeit unbedingt notwendig! Achtung: Evtl. Zusatzversicherung, falls auch Schäden von Zahnunfällen eingeschlossen sein sollen. Versicherungsbedingungen genau prüfen.

Alle Zahnunfälle unverzüglich der Versicherung melden. Das volle Ausmaß des Schadens wird oft Jahre später sichtbar; die Behebung kann u. U. sehr viel teurer zu stehen kommen, als es im Moment des Unfalls abzusehen ist.


Milchzähne

Milchzähne können Schäden an den noch nicht durchgebrochenen bleibenden Zähnen verursachen!




Abgebrochene Zahnkronen:

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist es, den Zahnarzt zu konsultieren.




Gelockerte Zähne:


Eine Behandlung ist nicht dringend (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).

**Verschobene Zähne:**

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt werden.

**Herausgeschlagene Zähne:**


Eine Behandlung ist nicht dringend, da es in den meisten Fällen nicht zweckmäßig ist, ausgeschlagene Milchzähne wieder einzusetzen (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).

**Hinein geschlagene Zähne:**

Eine Behandlung ist nicht immer nötig. Auf jeden Fall aber den Zahnarzt konsultieren! (Höchstes Risiko für den bleibenden Zahn!)


Bleibende Zähne

Die Chance für langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne ist umso besser, je rascher die korrekte Behandlung erfolgt (am besten innerhalb 1-2 Stunden).


**Abgebrochene Zahnkronen:**

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung (innerhalb Stunden).



Große abgebrochene Stücke wenn möglich zum Zahnarzt mitbringen.

**Gelockerte und verschobene Zähne:**

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt und eventuell geschient werden.

**Herausgeschlagene Zähne:**

Unter günstigen Umständen kann der Zahn wieder erfolgreich eingesetzt werden! Deshalb den Zahn in eine Zahnrettungsbox (Dentosafe[®]) geben oder sorgfältig in Milch einlegen und so schnell als möglich zum Zahnarzt bringen. Zahn nur an der Krone berühren! Falls keine Zahnrettungsbox oder Milch zur Verfügung stehen, Zahn in nasses Tuch (kein Papier!) einwickeln. Zahn nicht reinigen oder desinfizieren.

**Hinein geschlagene Zähne:**

Eine Konsultation ist dringend. Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht und eventuell geschient werden.